

CASO 1
ECOGRAFÍA ABDOMINAL

HISTORIA CLÍNICA

- Se trata de un macho Pointer de 25 kg de 10 años de edad.
- El motivo de la ecografía es por vómitos repetidos y diarreas. Hiporexia, apatía y dolor abdominal.



ANALÍTICA

En hemograma apreciamos leucocitosis con desviación a la izquierda.


Bioquímica sanguínea: aumento de urea y proteínas totales.

PREPARACIÓN ECOGRÁFICA


- Rasuramos a nivel abdominal, desde zona del esternón hasta abdomen caudal.
- Aplicación de gel ecográfico.

EXAMEN ECOGRÁFICO

- Realizamos un examen abdominal completo.
- Encontramos estómago dilatado con abundante contenido líquido, continuando, observamos duodeno y tramos de yeyuno dilatados con contenido líquido en su interior.



YEYUNO




EXAMEN ECOGRÁFICO

- En yeyuno, cuadrante lateral derecho de abdomen encontramos la siguiente estructura.



YEYUNO



A 2,82cm

B 6,08cm


6,5

INTUSUSCEPCIÓN


Se trata de una intususcepción o invaginación intestinal.


Tiene lugar cuando un segmento de intestino (intususceptum), contraído por una onda peristáltica, se introduce en el segmento inmediatamente distal (intususcipiens), arrastrando mesenterio tras él.

INTUSUSCEPCIÓN



INTUSUSCEPCIÓN (IMAGEN TRANSVERSAL)





ICIPIENS


CEPTUM
TRAMO
INTESTINAL

CEPTUM
MESENTERI
O

ICIPIENS: INTUSSUSCIPENS
CEPTUM: INTUSSUSCEPTUM

INTUSUSCEPCIÓN (IMAGEN LONGITUDINAL)





ICIPIENS: INTUSSUSCRIPTIONS
CEPTUM: INTUSSUSCEPTION

CAUSAS

Enteritis (virales, bacterianas)

Cuerpos extraños

Parásitos intestinales

Cirugía abdominal previa

Neoplasia intestinal

La mayoría son idiopáticos.

CAUSAS

Cualquier condición que provoque alteraciones en la motilidad gastrointestinal predispone a la aparición de una intususcepción.

Existe una incidencia más elevada en caninos y felinos menores de 1 año.

CAUSAS

En nuestro caso se trataba de un macho de 10 años de edad.

Anteriormente a los vómitos presentó un cuadro de diarreas, posiblemente la motilidad aumentada provocó la intususcepción.

TRATAMIENTO

QUIRÚRGICO

En nuestro caso se realizó una enterectomía por no ser viable el segmento intestinal afectado.

